

Bewertungsmatrix Nordfriesland Makrophytobenthos-Index							
Qualitätskategorien	0	1	2	3	4	Gewichtung %	
	Schlecht	Unbefriedigend	Mäßig	Gut	Sehr gut		
Norm-EQR	0 – 0,19	0,2 – 0,39	0,4 – 0,59	0,6 – 0,79	0,8 – 1,0		
Modul Seegras ⁶	Eulitorale Fläche (%) ¹	< 2	2 - 4,9	5 - 9,9	10 - 19,9	20 - 100	50
	Anteil ≥ 60 % Bedeckung (%) ²	< 6	6 - 11,9	12 - 24,9	25 - 49,9	50 - 100	10
	Präsenz beider Arten (%) ³	< 20	20 - 39,9	40 - 59,9	60 - 79,9	80 - 100	10
Modul Grünalgen ⁷	Eulitorale Fläche (%) ⁴	100 - 15	14,9 - 7	6,9 - 3	2,9 - 1	< 1	20
	Anteil ≥ 60 % Bedeckung (%) ⁵	100 - 50	49,9 - 25	24,9 - 12	11,9 - 6	< 6	10

1 Seegraswiesen mit ≥ 20 % Bedeckung auf eulitorale Fläche.

2 Flächenanteil von Seegraswiesen mit ≥ 20 % Bedeckung, wo die Bedeckung ≥ 60 % liegt.

3 Einzelfunde werden nicht berücksichtigt (Seegrasart muss ≥ 5 % der Fläche einer Wiese mit ≥ 5 % Bedeckung einnehmen)

4 Grünalgenmatten mit ≥ 20 % Bedeckung auf eulitorale Fläche.

5 Flächenanteil von Grünalgenmatten mit ≥ 20 % Bedeckung, wo die Bedeckung ≥ 60 % liegt.

6 Angaben beziehen sich auf das Maximum der Wuchssaison eines Jahres, kartiert von Mitte Juli bis Mitte September.

7 Angaben beziehen sich auf das beobachtete Maximum der Wuchssaison eines Jahres (variabel zwischen Juni bis September).